

Diagnos

Fraktur i nedre delen av lårbenet.

Symtom

Smärta i lårbenet och knäleden.

Orsak

Fallolycka, hos äldre ofta i kombination med benskörhet.

Förekommer även hos patienter med knäprotes.

Vem drabbas

Vanligast hos kvinnor eftersom benskörhet är vanligare förekommande hos kvinnor.

Vad kan jag göra själv?

Rökare bör sluta röka. Utredning av eventuell benskörhet via husläkaren.

Behandling

Akut operation.

Operation

Operation där frakturen läggs till rätta och fixeras med platta och skruvar.

Risker

Sår-läkningskomplikationer hos ett fåtal och viss risk för frakturläkningsproblem. Blodpropp i vaden kan förekomma men risken minimeras med blodförtunnande sprutor. Varningssignal för blodpropp är feber och ökande svullnad eller smärta i vaden eller låret. Om det finns tecken på infektion eller blodpropp bör man genast uppsöka läkare.

Förväntat resultat

De flesta patienter som opereras för en fraktur i nedre delen av lårbenet får en god funktion men inte riktigt lika bra som före skadan.

Sjukskrivning/rehabilitering

De flesta patienter som drabbas av denna skada är i pensionsålder men även unga kan drabbas. Då är sjukskrivningstiden helt beroende på typen av arbete.

