



Förberedelser inför din gastroskopi i propofolsedering*

- Kontakta oss omgående om du behandlas med blodförtunnande mediciner som Plavix, Clopidogrel, Grepid, Tiklid, Eifent, Pradaxa, Brilinta, Brilique, Arixtra, Eliquis, Xarelto, Lixiana, Waran, Marevan, Marcumar, Innohep (gäller ej Trombyl) eller om du har KOL, hjärtsjukdomar, övervikt (BMI över 35), sömnapné, använder CPAP eller är allergisk mot ägg/soja.
- Är du insulinbehandlad diabetiker; diskutera med din läkare/sjuksköterska om eventuell insulinjustering inför undersökningen.
- Fyll i hälsodeklarationen och skicka i retur till oss.

Du får **inte** äta fast föda 6 timmar före undersökningen. Du kan dock dricka max 3 dl vatten och ta dina eventuella läkemedel. 2 timmar före undersökningen ska du vara helt fastande.

Du får **inte** röka eller snusa 4 timmar före din undersökning på grund av ökad magsaftsproduktion.

Hur går gastroskopiundersökningen till?

Undersökningen kommer att ske i Propofolsedering*.

Före undersökningen sprayas du i svalget med lokalbedövning. Via munnen inspekteras matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Instrumentet är en mjuk och böjlig slang med kamera längst fram, så att undersökningen kan visas på en skärm.

Vävnadsprov och enklare ingrepp t.ex. borttagning av polyper kan utföras.

Undersökningen tar ca 20 minuter.

Efter undersökningen

Du kommer att behöva vila en stund på mottagningen efter undersökningen

Avvakta med mat och dryck tills bedövningen har släppt i svalget (ca 60 minuter). Därefter kan du äta och dricka som vanligt om inget annat sägs.

Bilkörning och/eller intag av alkohol är inte tillåtet under resten av dagen.

Preliminärt undersökningsresultat får du innan du går hem. Svar skickas till remitterande läkare.

*Propofolsedering = narkos med personal som har klinisk kompetens

Enhet: Endoskopicentrum	Sida: 1 (1)
Dokumentägare: Pia Forsberg, Vårdenhetschef Endoskopicentrum Medicinkliniken	Giltigt från: 2022-04-05
Dokument-ID: 19592496	Version: 3.0