



## Förberedelser inför din koloskopi i propofolsedering\* med Laxabon

- Hämta ut dina läkemedel, antingen via skickat e-recept och eller bifogade pappersrecept, på valfritt apotek.
- Kontakta oss omgående om du behandlas med blodförtunnande mediciner som Plavix, Clopidogrel, Grepid, Tiklid, Eifent, Pradaxa, Brilinta, Brillique, Arixtra, Eliquis, Xarelto, Lixiana, Waran, Marevan, Marcumar, Innohep (gäller ej Trombyl) eller om du har KOL, hjärtsjukdomar, övervikt (BMI över 35), sömnapné, använder CPAP eller är allergisk mot ägg/soja.
- Är du insulinbehandlad diabetiker; diskutera med din läkare/sjuksköterska om eventuell insulinjustering inför undersökningen.
- För att förbättra tarmrengöringen ska du köpa det receptfria läkemedlet dospulver Movicol. Ta Movicol 1 dospåse 2 gånger om dagen under 3 dagar innan intag av laxeringsmedlet Laxabon. Följ anvisningarna som medföljer förpackningen.
- Fyll i hälsodeklarationen och skicka i retur till oss.

### Veckan innan undersökningen

Tar du läkemedel som järnmediciner eller bulkmedel t.ex. Inolaxol, Vi-Siblin eller liknande ska du sluta med dessa 7 dagar innan undersökningen.

Ät en lätt kost som **inte** innehåller fiber/fullkorn, skal, kärnor/frön. Undvik t.ex. müsli, grovt bröd, majs, oliver, tomater, bönor, kiwi, citrusfrukter, vindruvor, hallon m.m. Dessa födoämnen kan stanna kvar i tarmen i flera dagar och försvåra inspektion av tarmens slemhinna.

**Exempel på lätt kost:** fisk, kyckling, yoghurt utan bitar, fil, vitt bröd med ost/skinka, omelett, mannagrynsgröt, köttfärs, ris, potatis och pasta. **Menyförslag** hittar du på [www.capiostgoran.se/endoskopacentrum](http://www.capiostgoran.se/endoskopacentrum) under fliken koloskopi.

### Dagen innan undersökningen

Ät en lätt frukost (se tidigare exempel på lätt kost). Till lunch får du äta soppa utan fast innehåll. Därefter får du **ENBART** dricka klar dryck\*\*.

### Laxering med Laxabon

Laxabon är ett laxeringsmedel som används för att tömma tarmen så att den är ren vid din undersökning. Var nära en toalett när du börjar med laxeringen. Tarmen kommer igång lättare om du håller dig i rörelse under tiden. Se instruktion på nästa sida.

Undersökningen kan behöva göras om ifall tarmen inte är ren.

Vänligen vänd

\*Propofolsedering = narkos med personal som har klinisk kompetens.

\*\* Klar dryck = vatten, buljong, juice utan fruktkött, saft, läsk, sportdryck, kaffe och te utan mjölk, Laxabon

Enhet: Endoskopicentrum	Sida: 1 (2)
Dokumentägare: Pia Forsberg Vårdenhetschef Endoskopicentrum Medicinkliniken	Giltigt från: 2022-05-16
Dokument-ID: 19620556	Version: 3.0

## Bortse från Apotekets rekommendationer och följ anvisningar nedan:

Varje påse Laxabon löses upp med 1 liter vatten och blandas ordentligt tills allt pulver är löst.

- **Har du tid före kl. 10.00** skall du dricka Laxabon  
2 liter mellan kl. 15.00 - 16.00 dagen före undersökningen  
1 liter mellan kl. 18.00 - 19.00 dagen före undersökningen  
1 liter 5 - 6 timmar före din bokade tid undersökningens morgon  
(t.ex. har du tid kl. 8.00 skall du dricka mellan kl. 02.00 - 03.00)
- **Har du tid kl. 10.00 eller senare** skall du dricka Laxabon  
2 liter mellan kl. 18 - 19 dagen före undersökningen  
2 liter 5 - 6 timmar före din bokade tid undersökningens morgon  
(t.ex. har du tid kl. 10.00 skall du dricka mellan kl. 04.00 - 05.00)

Laxabon verkar lokalt i tarmen. För att hålla vätske- och sockerbalansen på en bra nivå bör du även dricka klar dryck\*\* under tiden du laxerar.

Efter avslutad laxering får du dricka max 3 dl vatten och ta eventuella läkemedel.  
2 timmar innan undersökningen ska du vara helt fastande.

Du får **inte** röka eller snusa 4 timmar före din undersökning på grund av ökad magsaftsproduktion.

## Hur går gastro- och koloskopiundersökningen till?

Undersökningen kommer att ske i propofolsedering\*.

Vid koloskopiundersökningen inspekteras tjocktarmen via ändtarmen eller via stomiöppningen om du har stomi.

Instrumenten är mjuka och böjliga slangar med kamera längst fram, så att undersökningen kan visas på en skärm.

Vävnadsprov och enklare ingrepp t.ex. borttagning av polyper kan utföras.

Undersökningen tar ca 60 minuter.

## Efter undersökningen

Du kommer att behöva vila en stund på mottagningen efter undersökningen

Du kan äta och dricka som vanligt om inget annat sägs.

Bilkrörning och/eller intag av alkohol är inte tillåtet under resten av dagen.

Preliminärt undersökningresultat får du innan du går hem. Svar skickas till remitterande läkare.

\*Propofolsedering = narkos med personal som har klinisk kompetens

\*\* Klar dryck = vatten, buljong, juice utan fruktkött, saft, läsk, sportdryck, kaffe och te utan mjölk, Laxabon

Enhet: Endoskopikum	Sida: 2 (2)
Dokumentägare: Pia Forsberg Vårdenhetschef Endoskopikum Medicinkliniken	Giltigt från: 2022-05-16
Dokument-ID: 19620556	Version: 3.0