

Appendicit

Cirka en av tio personer i Sverige opereras någon gång för en blindtarmsinflammation. På Capiro S:t Görän har vi ett effektivt och strukturerat flöde för patienter som kommer in med misstänkt appendicit, vilket leder till onödiga väntetider för patienten.

Patienter som genomgår en blindtarmsoperation söker med buksmärta via akutmottagningen. Operationen sker med titthålsteknik och patienten kan oftast gå hem några timmar efter operation.

Appendiciter i siffror

Kvalitetsregister: Eget kvalitetsregister på CStG



550

Genomförda operationer
2022



97 %

Akuta operationer
2022



40 år

Medelålder

98 %

Rätt diagnos
539/550

98 %

Påbörjad laparoskopiskt
539/550

0,9 %

Urinretention efter operation
5/550

Ibland är inte blindtarmen skyldig till patientens besvär. Med standardiserad utredning hålls andelen hög.
Mål >97 %

Andel operationer påbörjade med titthålsteknik

Andel patienter som fått urinkateter på grund av resurin efter operation.
Mål <2,0 %



Om appendicit

Orsaken till appendicit är i flertalet fall oklar men tilltäppning av blindtarmsöppning kan vara en möjlig orsak. Akut appendicit kan drabba alla åldrar men är vanligast bland unga vuxna (20-30 år).

År 1889 genomförde Karl Gustav Lennander den första appendektomin i Sverige. Alltsedan dess har akut operation varit den helt ledande behandlingen.

Akut appendicit förekommer i ett flertal olika former. Icke perforerad appendicit (okomplicerad appendicit) är den klart vanligaste formen.

Andelen patienter med brusten blindtarm (komplicerad appendicit) har sedan länge legat tämligen konstant på 20 – 25 %, andelen är högre hos små barn och äldre.

Cirka 4 % av patienterna med brusten blindtarm har en varböld utvecklats vilket kan föranleda till att man inte väljer att operera i det akuta skedet.

På S:t Görans har vi sedan 1994 fört ett kvalitetsregister över patienter som opererat bort blindtarmen i syfte att följa och utveckla kvalitén. Detta har medfört en hög precision gällande rätt behandling till rätt patient.