

# Cholecystektomi

Cholecystektomi innebär att gallblåsan opereras bort. Det kan ske laparoskopiskt, d.v.s med titthålsteknik eller med öppen teknik.

Indikation för operation kan vara upprepad gallstenssmärta eller komplikationer av gallsten, såsom t.ex. gallblåseinflammation eller sten i djupa gallgången. Sten i djupa gallgången kan i sin tur orsaka bukspottkörtelinflammation, gulsot eller infektion. Större polyp i gallblåsan kan också vara indikation för operation.

Kirurgin kan göras elektivt eller akut. Operationen räknas som akut om den görs inom samma vårdtillfälle.

Patienterna remitteras internt och externt, akut och elektivt, eller söker själva via akutmottagningen med gallsten eller gallstenskomplikationer. De som sedan går vidare till kirurgi ingår i flödet.

# Cholesystemektomi i siffror

Kvalitetsregister: GallRiks



**429**

Genomförda galloperationer  
2022



**79 %**

Elektiva operationer  
2022



**54 år**

Medelålder

**0,0 %**

Gallgångsskada  
0/429

Djup gallgångsskada vid elektiv  
operation  
Rikssnitt 0,3 %

**99,5 %**

Påbörjad laparoskopiskt  
1/429

Operationen påbörjas  
laparoskopiskt

**3,3 %**

Konvertering  
14/429

Operation konverterad från  
laparoskopisk till öppen  
Rikssnitt 9,1 %



# Förbättringsarbeten / projekt

## Flödessal på operation

För att minska ledtiderna på operation kommer arbetet med flödessalar återupptag för galloperationer. Syftet är att genom standardiserade arbetssätt skapa ett effektivare operationsflöde med minskad stress och förbättrad arbetsmiljö.