

Höftfraktur

Patienter med höftfraktur handläggs med ett prioriterat omhändertagande då risk för komplikation och vårdtid ökar med förlängd väntetid till operation.

Med ett sjukhusgemensamt fokus till denna patientgrupp förväntar vi oss att kunna operera minst 75 % inom 24 timmar efter registrerad ankomst till akutmottagningen.

I patientgruppen höftfraktur ingår i huvudsak tre typer av frakturer; Cervikal-, Trochantär- och Subtrochantär höftfraktur.

Den operativa tekniken består i frakturfixation alternativt protesförsörjning med utgångspunkt ifrån; frakturtyp, biologisk ålder, funktionskrav och riskprofil.

Val av implantat och operationsteknik sker enligt rutin med utgångspunkt från gällande vårdprogram som är utarbetade utifrån aktuell vetenskap och registerdata.

Höftfraktur flödet i siffror

Kvalitetsregister: Svenska frakturregistret



592

Antal frakturer under året



100%

Andel akuta operationer



4,3

Medelvårdtid/dygn (2022)

0,2 %

Trycksår/-skada Grad 3- 4
Internt förvärvade (1/592)

82 år

Snittålder

60%

Andel opererade inom 24h
355/592



Förbättringsarbeten / projekt

- Identifiera och implementera förbättringar som kan leda till kortare bytestider, rätt prioritering i operationsflödet samt kortare operationstid
- Utbildning och genomgång med de preoperativa förberedelserna för att optimera patienterna inför operationen