

Höftplastikflödet

Inom höftsektionen handläggs i huvudsak artrostillstånd i höftled som standardmässigt opereras med cementerad höftledsplastik.

För patienter biologiskt 65 år och yngre används ofta en ocementerad stam i lårbenet. De flesta får ett beprövat koncept med cementerad skål i bäckenet, i bland används ocementerad skål i bäckenet. Vid komplexa fall används i enstaka fall andra typer av stammar och skålar.

Beträffande höftkirurgin är den stora majoriteten primära höftplastiker. Därtill utförs alla former av reoperationer. Akut vid djup infektion, protesnära fraktur eller luxation och planerat vid slitage, lossning och återkommande luxationer/ instabilitet.

Höftplastikflödet i siffror

Kvalitetsregister: Svenska ledplastikregistret




360

Antal höftplastikoperationer



100 %

Samtliga operationer utförs
planerat dvs inte akut



3,0

Medelvårdtid/dygn (2022)

1,6 %

Reoperationer höftplastik inom 2 år,
(2018-2021)

Källa: Svenska ledplastikregistret .
Snitt för Sverige 2,1%

0,4 %

Reoperationer höftplastik inom
2 år, pga djup infektion (2018-
2021)

Källa: Svenska ledplastikregistret .
Snitt för Sverige 1,2%

**Blev du bemött med
medkänsla och omsorg?**

99 %

Patientenkät som mäts kontinuerligt
i 1177



Förbättringsarbeten / projekt

Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete som sker på kliniken

- Kliniska resultat sammanställs via Svenska ledplastikregistret och analyseras
- Fortsatt samarbete mellan Capios ortopediska enheter för kunskapsutbyte och harmonisering av rutiner med regelbundna möten
- Projekt återgång till standardiserade arbetssätt i höftplastikflödet tillsammans med anestesikliniken